

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
(ആഗസ്റ്റ് 05 - ആഗസ്റ്റ് 11, 2022)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ, മല്ലുത്തി - 680 651

E-mail: cemannuthy@kau.in, Phone: 0487-2370773

No. C3/4/2022 – 31

Dt. 04.08.2022

ഇന്ത്യാച്ചത്രത വിള പരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ സസ്യസംരക്ഷണ നടപടികൾ കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കണം. പോളരോഗം കൂടുതലായി കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രോഗബാധ വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി സ്വീകരിക്കാനാണ് 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തളിക്കണം. എല്ലാ വർഷവും ഈ രോഗം കണ്ണു വരാറുള്ള നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ പ്രതിരോധഗ്രാഫിയുള്ള ഇനങ്ങൾ കൂഷി ചെയ്യണം. ഓലച്ചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെ നിയന്തിക്കുന്നതിനായി ബ്യൂവേറിയ എന ജീവാണു കർച്ചർ 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കുക. തളിക്കുന്നോൾ ഓലകളുടെ അടിയിൽ ലായനി എത്തവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മുണ്ട ബാധ വരാതിരിക്കാനായി 0.5% വീരുമുള്ള വേപ്പെല്ലാ ഇമഗ്രഷൻ തളിച്ചു കൊടുക്കാം. 10 ലിറ്റർ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കാനായി ചെരു ചുടു വെള്ള തതിൽ 50 ശ്രാം ബാർഡോപ്പ് നന്നായി അലിയിച്ച് ചേർത്തതിന് ശേഷം 50 മില്ലി വേപ്പെല്ലാ അരിച്ചു ചേർത്ത് നല്ലതു പോലെ ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കാം. നെല്ലിലെ ബാക്ടീരിയൽ ഇലക്രിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ 20 ശ്രാം പച്ചചാണകം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയതിന്റെ തെളി എടുത്ത് 20ഗ്രാം സ്വീകരിക്കാനാണ് പൊടി അതിൽ ചേർത്ത് തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

മെയ് മാസത്തിൽ നട തെങ്ങിൻ തെക്കുകൾ ഇരു മാസം വളരു ചേരുക്കാം. ഓരോ ചുവടിലും ഒരു കൂടു ഉണക്കിപ്പൂട്ടിച്ചു ചാണകം ഇടു കൊടുക്കണം. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ തെങ്ങിന്റെ കൂടു വളരു 250 ശ്രാം ചുറ്റും വിതരി കൊത്തിച്ചേരുക്കണം. കൂഴിക്കു ചുറ്റും വരം ബലപ്പെടുത്തി ഒഴുക്കു വെള്ളം പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയണം. ചരിവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണാലിപ്പ് തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൈകൈക്കാള്ളണം. കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങുകളുടെ ഓലകൾക്ക് നല്ല പച്ച നിറം കിട്ടാനും എല്ലായും ഉല്പാദനം കൂട്ടാനും തെങ്ങാനിന് 500 ശ്രാം വീതം മണിഷ്യം സർവേരു ചേരുകുന്നത് നല്ലതാണ്.

തുടർച്ചയായ മഴ മുലം, തെങ്ങിൽ കുന്നുചീയൽ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തെങ്ങിലെ കുന്നുചീയൽ രോഗത്തിനു മുൻകരുതലായി സുഷിരങ്ങൾ ഇടു മാങ്കാസെബ് സാഹ്യ (5ശ്രാം) മുന്നു പായ്ക്കരു വീതം ഓരോ തെങ്ങിന്റെ കുന്നിനു ചുറ്റും വയ്ക്കുക. മഴ പെയ്യുന്നോൾ മരുന്നു കുറേശെയായി കുന്നിലേക്കു ലഭിച്ചിരഞ്ഞുന്നതു വഴി ഈ രോഗം ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാം. 1% വീരുമുള്ള ബോർഡോമിശ്രിതമോ അല്ലെങ്കിൽ 0.2% കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (കൊസെബ്) എന കുമിൾ നാശിനിയോ പരെ ചേർത്ത് തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡയിൽ മഴയില്ലാത്തപ്പോൾ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കും.

തുടർച്ചയായ മഴ മുലം, വാഴയിൽ എർവിനിയ രോട്ട് രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. നീർവാർച്ച സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും വാഴത്തടങ്ങളിൽ കുമ്മായം ഇടുന്നതും, നീർച്ചാലുകളിൽ ഷീച്ചിങ്സ് പാധർ ഇടുന്നതും നല്ലതാണ്. 20 ശ്രാം സ്വീകരിക്കാനാണ് മഞ്ഞിസന്ന് പൊടി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായനി

മൺ കുതിരത്തകവല്ലം, വാഴയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒഴികുന്നത് രോഗപ്രതിരോധഗേഷി വർധിപ്പിക്കും. രോഗം ബാധിച്ചാൽ 3 ശ്രാം കോപ്പൾ ഓക്സിക്സോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ശ്രാം കോപ്പൾ ഘോഗ്യോക്സൈസിൾ (കൊസൈസിൾ) ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ലായനി മൺ കുതിരത്തകവല്ലം, വാഴയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒഴിക്കണം.

നട് ഒരുവർഷം പ്രായമായ ജാതി തെയ്യക്ക് യുറിയ, മസൂറിഫോസ്, മൃഗിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടോഷ് എന്നിവ യഥാക്രമം 45, 100, 90 ശ്രാം വീതം ചേർക്കാം. രണ്ടു വർഷം പ്രായമായതിന് 90, 200, 180 ശ്രാം വീതവും ചേർക്കണം. മുന്നാം വർഷം വള്ളത്തിന്റെ അളവ് ക്രമമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് 15 വർഷം പ്രായമാകുന്നതോടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വള്ളങ്ങൾ 1 കിലോ, $1\frac{1}{4}$ കിലോ, $1\frac{3}{4}$ കിലോ എന്ന തോതിൽ നൽകണം.

സ്വീഡോമോണാസ് പൊടി 200 ശ്രാം വീതം ഓരോ ജാതിയുടെയും ചുവട്ടിൽ ജൈവവളവുമായി ചേർത്ത് ചവറിൽ മുടുന്നതും, ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 20 ശ്രാം എന്ന തോതിൽ വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മുന്നോ പ്രാവശ്യം ഫയ്യുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും മരങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുടുന്നതിനും കായ്പിടുത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നല്കാം.

തുടർച്ചയായ മഴമുലം കുരുമുളകിൽ ദ്രോതവാട്ടരോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. രണ്ടു കിലോ ടെട്ടക്കോഡാർമ 90 കിലോ ചാണകപ്പോടിയും, 10 കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കുമായി കൂട്ടി കലർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇഉർപ്പം നിലനിൽക്കത്തക വല്ലം രണ്ടാഴ്ചയെയ്ക്ക് വയ്ക്കുക. ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ വീതം ഓരോ കുരുമുളക് ചെടിക്ക് ചുവട്ടിലും ഇടു കൊടുക്കുക. രോഗം കുടുന്ന പക്ഷം 1% വീരുമുളള ഭോർഡോ മിശ്രിതമോ അല്ലെങ്കിൽ 3 ശ്രാം കോപ്പൾ ഓക്സിക്സോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ശ്രാം കോപ്പൾ ഘോഗ്യോക്സൈസിൾ (കൊസൈസിൾ) ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് മൺ കുതിരത്തക വല്ലം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെടിയിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

മഴക്കാലത്ത് ജാതി മരങ്ങൾക്ക് ഇലകൊഴിച്ചിൽ, വേരു ചീയൽ, തടിയിൽ നിന്നും കരയോലിപ്പ് എന്നീ രോഗങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്നു. കുമിൾ ബാധ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഈ രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഇലകളിൽ ഒരു ശതമാനം ഭോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക. കൂടാതെ ചെമ്പു കലർന്ന കുമിൾ നാശിനികളിൽ ഒന്ന് (കോപ്പൾ ഘോഗ്യോക്സൈസിൾ 2 ശ്രാം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പൾ ഓക്സിക്സോറൈഡ് 3 ശ്രാം/ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) മരത്തിന് ചുറ്റും തടമെടുത്ത് മരം ഒന്നിന് 10 മുതൽ 20 ലിറ്റർ വരെ എന്ന തോതിൽ മൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തായ്തതകിയിൽ കരയോലിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഭോർഡോ കുഴന്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഘോക്സാകോണാസോൾ 5 മി.ലി/ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന അളവിൽ പുരട്ടി മഴക്കാളളാതെ സുക്ഷിക്കുക. ഭോർഡോ കുഴന്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 100 ശ്രാം നീറ്റുകകയും 100 ശ്രാം തുരിശും $\frac{1}{2}$ ലിറ്റർ വീതം വെള്ളത്തിൽ വെച്ചേരെ കലക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക.

മഴക്കാലത്ത് പച്ചക്കരികളിൽ മൃദുരോമപ്പെപ്പ് എന്ന കുമിൾ രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. പ്രതിവിധിയായി 20 ശ്രാം ടെട്ടക്കോഡാർമ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. രോഗ തീരുത കൂടുതലാണെങ്കിൽ 2 ശ്രാം കർണ്ണേശ്വര്

എം 8 ഒരു പ്രിൻസിപൽ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ 15 ദിവസം ഇടവിട്ട് ഇലയുടെ അടിയിൽ പതിയ്ക്കേതെങ്കിൽ വിധത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.

അറിയിപ്പ്

- കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മണ്ണത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറർഡിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മകത്തിൽ കർഷകർക്കായി വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആട്ട വളർത്തൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നു. 2022 ആഗസ്റ്റ് 12 ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറർ മണ്ണത്തിയിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുക. ഫോൺ നമ്പർ - 0487-2370773
- കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മണ്ണത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറർഡിൽ കാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, കല്പയേന്നു എന്ന കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ വെത്രമാസിക പ്രസിദ്ധീകരണവും വില്പനയ്ക്കുണ്ട്. ബന്ധ സ്ലൈഡേം ഫോൺ നമ്പർ : 0487-2370773
- കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറർഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഭേദ്യ സംസ്കരണശാലയിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കരികളും സംസ്കരിച്ച് ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം വിവിധ മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി നൽകുന്നു. പച്ചക്കരികൾ കൊണ്ടുള്ള കൊണ്ടാടങ്ങൾ (പാവൽ, വെണ്ട, പയർ), പൊടികൾ വിവിധ തരം അച്ചാറുകൾ, ജാം, പഴം ഹാർവ്, ചില്ലി സോസ്, തകാളി സോസ് തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ വാട്ടുകപ്പ പോലെ പഴം പച്ചക്കരികൾ ഉണക്കി സുക്ഷിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക സംസ്കരണവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

നിബന്ധനകൾ

1. കൂടണ്ണത്ത് 10 കിലോഗ്രാം പഴം പച്ചക്കരി ഉണ്ടാവണം.
2. കർഷകർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നമോ അസംസ്കൃത വസ്തുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം അനുസരിച്ച് വിപന്നന സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നമോ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നു.
3. മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടി വസ്തുക്കളുടെ വിലയും കൂലിച്ചീലവും കർഷകർ അടയ്ക്കണം.
4. മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം പാക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള വസ്തുക്കൾ കർഷകർ കൊണ്ടു വന്നാൽ അതിൽ പാക്ക് ചെയ്തും നൽകും.
5. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഇത് വിപന്നന ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഉൽപ്പന്നം കർഷകർ തന്നെ അവക്കുടെ സ്ഥാപനപേരിൽ വിപന്നന ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0487-2370773, 8089173650 എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ cctmannuthy@kau.in എന്ന മെയിൽ മുവേനയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്

ഒപ്പ്/
പ്രൊഫസർ & ഐഡി

